

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 16 - 5 - 774 10271

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Tél. (78) 60-95-87 (Postes 426 et 427) Tél. (78) 62.20.30 (P. 426 & 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.
55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Bulletin N° 83

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

5 Mai 1977

VIGNE

Black-rot (zones contaminées de la Savoie, du Bugey et des Cévennes) - Aproximité des vignes abandonnées on devra appliquer un nouveau traitement avant le 16 Mai, date à partir de laquelle pourraient apparaître les premières taches fructifères issues des contaminations du 28 au 30 Avril.

Vers de la grappe - Des captures de papillons ont déjà été obtenues dans le sud de la région et la moyenne vallée du Rhône, mais les conditions météorologiques n'ont pas été favorables de façon assez suivie à l'activité sexuelle de ces papillons pour que des attaques soient à redouter avant le milieu du mois.

Oïdium - Sur cépages sensibles, maintenir la protection, les sols détrempés constituant un environnement favorable au développement de la maladie.

ARBRES FRUITIERS, NOYER & PETITS FRUITS

A - MALADIES -

Tavelures sur pommier et poirier -

La protection devra être parfaitement assurée pendant la période du 13 au 18 Mai au cours de laquelle devraient apparaître les taches issues de contaminations du 28 au 30 Avril.

D'autre part ces pluies, très abondantes dans la plus grande partie de la région (généralement 50 à 110 mm) à l'exception de l'extrême nord (de la Bresse au Roannais) constituent des conditions favorables à la généralisation de la maladie, donc à la généralisation des traitements qui devront également intervenir le plus près possible du 13 Mai en toutes régions.

Tavelure du pêcher -

Dans les foyers habituels de la maladie, appliquer un traitement dès que possible.

Anthraxose du cerisier -

Un traitement devra être appliqué dans les prochains jours, notamment en pépinières.

On utilisera une des formules suivantes :

- doguadine (Dodinal BF ou Melprex) à 80 gr/hl de mat. act.
- folpel (16 spécialités) à 100 gr/hl de m. a.
- manèbe (16 spécialités) à 160 gr/hl de m. a.
- oxyquinoléate de cuivre (sauf en pépinières) (Quinoléate 20) à 50 gr/hl de cuivre-métal
- benomyl (Benlate) à 300 gr/hl de m. a.
- dithianon (Delan) à 50 gr/hl de m. a.

Bactériose du noyer -

Suivant les indications du bulletin précédent, le second traitement aurait dû être appliqué dans les premiers jours de Mai. Le troisième et dernier le suivra à un intervalle qui sera fonction de l'importance des précipitations survenues à la suite du second.

Didymella sur framboisier -

Maintenir la protection en toutes régions.

.../

Oidium du cassissier -

Maintenir la protection principalement en périodes chaudes et calmes.

B - RAVAGEURS

Tordeuse orientale du pêcher et anarsia (pépinières et arbres en formation) -

Des captures souvent nombreuses de tordeuse orientale (chenille rose) ont déjà été obtenues dans le sud de la région et la vallée du Rhône jusqu'à la banlieue lyonnaise mais les températures ont été trop irrégulières pour permettre une activité sexuelle des papillons de sorte que le premier traitement ne doit pas être envisagé avant le milieu du mois.

Toutefois dans les pépinières sujettes aux attaques de l'Anarsia (chenille brune) les chenilles hivernantes peuvent rentrer en activité d'un jour à l'autre et un traitement devra être appliqué dès le prochain réchauffement.

Psylle du poirier -

Contrariées par les refroidissements successifs, les éclosions de larves reprendront activement au prochain réchauffement et nécessiteront alors un nouveau traitement.

Puceron sur cerisier -

Traiter contre ce ravageur sans trop tarder, la maturité pouvant être assez hâtive en cas de réchauffement.

NOMENCLATURE DES REGIONS NATURELLES

- Département du RHONE -

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| - <u>Plaine de Lyon</u> jusqu'à la limite de l'agglomération | Région | 22 |
| - <u>Plaine de Lyon</u> au déjà de la limite de l'agglomération
(cette région faisant antérieurement partie de l'Isère a conservé son ancien numéro. Elle peut ne pas être rappelée dans le Rhône). | région | 102 |
| - <u>Vallée du Rhône</u> en aval de Lyon et versant du plateau, vallée du Garon | région | 24 |
| - <u>Plateau entre Rhône et Gier</u> : au dessous de 450 m | région | 25 |
| au dessus de 450 m | région | 11 |
| (La région 11 commune avec la Loire peut ne pas être rappelée dans le Rhône) | | |
| - <u>Vallée du Gier</u> | région | 26 |
| - <u>plateau Lyonnais</u> de Lentilly et Dardilly à la vallée du Gier, au dessous de 400 m | région | 21 |
| - <u>versant S.E.</u> des monts du Lyonnais, au dessus de 400 m | région | 27 |
| - <u>monts du Lyonnais</u> et bassin de la Coise | région | 28 |
| - <u>vallée de la Brèvenne</u> et premières pentes | région | 29 |
| - <u>Monts de Tarare</u> | région | 30 |
| - <u>vallée de la Turdine</u> en aval de Tarare | région | 31 |
| - <u>versant Loire</u> des monts du Beaujolais | région | 6 |
| (Région commune avec la Loire qui peut ne pas être rappelée dans le Rhône) | | |
| - <u>monts du Beaujolais</u> entre Turdine et Azergues | région | 32 |
| - <u>vallée de l'Azergues</u> en aval de Lam ure | région | 33 |
| - <u>Monts du Beaujolais</u> entre Azergues et Vignoble | région | 34 |
| - <u>Zone sud d'appellation Beaujolais</u> au sud d'Alix - Létra | | |
| - Dareizé | région | 36 |
| - <u>vignoble du Beaujolais</u> hors de cette zone | région | 35 |
| Des tranches d'altitudes peuvent le cas échéant être précisées | | |
| - <u>vallée de la Saone</u> non viticole en amont de Lyon | région | 37 |
| - <u>monts d'Or et versants</u> | région | 23 |

Le Chef de Circonscription phytosanitaire
"Rhône-Alpes",

R. GIREAU.

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes - Le Directeur-Gérant : P. JOURNET
Inscription à la C.P.P.A.P. N° 477 AD.

AVRIL 1977

DESHERBAGE DU MAÏS (fin)**B/ Produits de post-levée:**

Ces traitements sont : soit des formules de rattrapage intervenant en cas d'insuffisance des applications de pré-levée, soit des formules de complément adaptées à la destruction de plantes vivaces.

Un décalage de végétation entre les adventices et le maïs est souvent à rechercher afin d'intervenir sur des adventices jeunes, donc plus sensibles, alors que le maïs mesure 40 à 50 cm, ceci s'obtient par l'emploi d'une triazine classique en pré-levée.

A) Produits sélectifs (traitement en plein):

Matière active	Spécialité	Dose/ha de spécialité (1)	Epoque d'application	Spectre d'efficacité	Particularités d'utilisation
atrazine + huile	Mazipron	10 l	Post-levée	S : dicot., peut présenter un certain intérêt sur gram. très jeunes.	
2,4-D sel d'amine	Nombreuses spécialités	500 g de M.A.	Post-levée maïs ayant moins de 4 feuilles.	S : Iséron, Chardon, certaines dicotylédones annuelles.	Peut s'associer à de l'atrazine pour compléter l'action sur dicotylédones.

B) Produits non sélectifs (traitements dirigés):

L'utilisation de ces spécialités implique obligatoirement l'emploi de rampes spéciales équipées de jets miroir à basse pression et de déflecteurs, ne traiter que par temps calme, éviter les fortes chaleurs.

ametryne	Amephyt	3 à 4 kg	Post-levée maïs de 40 à 60 cm.	S : gram.: Digitaire, Panic, Setaire, Agrostide, Paturin, Vulpin. dicot.: Amarante, Chénopode, Renouées, etc... présentes ou levant après le traitement.	Les adventices doivent être en végétation active et avoir au max. 3 à 4 feuilles. Compatible avec 2,4-D sel d'amine, 2,4,5-T et fénoprop. Ne pas traiter les maïs de semence.
terbutryne	Ighane autosuspensible	5 l	Post-levée maïs de 40 à 60 cm	S : gram.: Digitaire, Panic, Setaire, Vulpin, Ray-grass, Brome. dicot.: nombreuses espèces annuelles présentes ou levant après le traitement.	Les adventices doivent être en végétation active et avoir au max. 3 à 4 feuilles. Action assez lente mais rémanente. Possibilité d'adjonction d'huile paraffinique. Ne pas traiter les maïs de semence.

P274

Matière active	Spécialité	Dose/ha de spécialité (1)	Epoque application	Spectre d'efficacité	Particularités d'utilisation
linuron	Nombreuses spécialités	2500 g de M.A.	Post-levée maïs de 40 à 50 cm min	S : gram. et dicot. annuelles <u>Jeu-nes</u> (10 cm max.) et levant après traitement.	Ne pas traiter par temps chaud (sup. à 30°) ou menace de pluie. Peut être associé à de l'atrazine ou à une huile, la dose est alors ramenée à 1500 g.
paraquat	Gramoxone 2 Gramixel 2	3 l	Post-levée maïs de 45 cm	S : gram. et dicot. annuelles le- vées. Action intéressante sur Chiendent s'il y a eu au préalable un trait. à l'aminotriazole.	Arrêter les traitements dès l'apparition des racines coronaires.
2,4-D sel d'amine	Nombreuses spécialités	1200 g de M.A.	Post-levée maïs ayant 45 à 50 cm	S : Liseron, Chardon et certaines dicotylédones annuelles.	Ne pas traiter par T° sup à 25°, réduire la dose à partir de 20°. Temps calme.
2,4,5-T	Nombreuses spécialités	1000 g de M.A.	Post-levée maïs ayant 40 à 60 cm	S : Gesse tubéreuse, <u>Ronce</u> .	Ne pas traiter par T° sup à 25°, réduire la dose à partir de 20°. Ne pas traiter pendant l'émission des racines coronaires Peut s'associer au 2,4-D.
fénoprop = 2,4,5-TP	Nombreuses spécialités	1200 g de M.A.	Post-levée maïs ayant 40 à 60 cm	S : Gesse, Liseron, Ronce, Chardon, Potentille, Prêle.	Ne pas traiter par T° sup. à 25°, réduire la dose à partir de 20°.
aminotriazole + thiocyanate d'ammonium	Nombreuses spécialités	7,5 l	Post-levée	S : Chiendent, Cynodon	Compléter l'action par un traitement au paraquat 10 jours après. Possibilité d'ajouter une huile (5 l/ha).

(1) - Les doses sont parfois indiquées en g de Matière Active / ha, lorsqu'il existe de nombreuses spécialités à des concentrations différentes.

S : sensible.

Le Chef de la Circonscription phytosanitaire

"Rhône Alpes":

R. GIREAU.